

Nestkast voor Kleine Bonte Spechten



Instructies

Haagse Vogelbescherming

Ophanghoogte boven 3 meter.

Bevestiging op (noord- of zuid-) oostzijde in bomen. Liefst met wat beschutting in de buurt om rustig te kunnen aanvliegen.

Jaarlijks vóór of na het broedseizoen schoonmaken. Nestkasten jaarrond laten hangen. Worden 's winters als slaappleats gebruikt.

(z.o.z. voor algemene informatie over de Kleine Bonte Specht)

U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid!

Haagse Vogelbescherming (HVB) en Vogelopvang "De Wulp"
Heliotrooplaan 15
2555 MA Den Haag

Contact: info@haagsevogels.nl

Websites: www.haagsevogels.nl en www.vogelopvangdewulp.nl

Giften: IBAN NL 12 INGB 0003 58 61 85

De **kleine bonte specht** (*Dryobates minor*) is een standvogel in een groot deel van Europa en Azië, waar hij voornamelijk in gematigde en boreale bossen leeft. De kleine bonte specht voedt zich keverlarven, bladluizen en kleine ongewervelde dieren. Het is de kleinste specht in een groot deel van zijn verspreidingsgebied. De lichaamslengte van een volwassen vogel bedraagt 14 tot 16 cm en de spanwijdte 25 tot 27 cm.

De snavel en poten zijn grijs gekleurd en de iris kastanjebruin. Het verenkleed is van boven overwegend zwart en aan de onderzijde wit met donkere streepjes. De vleugels zijn van boven gebandeerd met brede, witte banen. De zwarte onderrug heeft smallere witte banen. De staart is wit gebandeerd. De staartpenen met stugge veerschachten bieden extra ondersteuning tijdens het klimmen. De kop is overwegend wit op de zijkanten en de keel. Vanaf de snavel loopt een zwarte baardstreep door tot halverwege de nek. Het voorhoofd is wit, vaak met een gele tint.

Het mannetje heeft een rode kruin, aan de zijkanten gebiesd met een zwarte streep. Het vrouwtje heeft een geheel zwarte kruin en is dus geheel zwart-wit gekleurd. Het juveniele mannetje heeft een roze vlek op de voorste helft van de kroon, bij het vrouwtje is deze plek donker of grijs gevlekt.

De kleine bonte specht vertoont qua gedrag en leefwijze veel overeenkomsten met de grote bonte specht. Ook de sterk golvende vlucht van beide vogels lijken sterk op elkaar. Hij brengt het grootste deel van de dag door in de bovenste boomlagen. 's Nachts slaapt hij in oude nestholtes. Hij prefereert loofbossen en boreale bossen, maar komt ook voor in gemengde bossen, oeverbossen, boomgaarden en parken. De kleine bonte specht kan zich goed handhaven in productiebossen, mits er voldoende volwassen en dode bomen aanwezig zijn

De zang is een serie van 8 tot 16 hoogfrequente, fluitende *kie*-tonen, die aan het eind in snelheid afnemen Dit geluid lijkt op de roep van kleine valken. De alarmroep is een korte, schelle en zeer luide *kiek*.

Beide geslachten van de kleine bonte specht roffelen; al doet het mannetje dit meer. De roffel kan het gehele jaar door worden gehoord, maar aanzienlijk frequenter tijdens de baltsperiode. De roffel is snel en heeft een gelijkmatig tempo. Meestal worden twintig tot dertig slagen gemaakt in één à twee seconden. Wanneer dit op een dunne, droge tak gebeurt, dan geeft dit een typisch hoog, ratelend geluid. Kenmerkend zijn ook de twee snelle roffelseries die hij regelmatig laat horen. Deze series worden kort achter elkaar gemaakt, alsof er een hapering is.

Het voedsel bestaat voor het grootste deel uit bladluizen, rupsen, spinnen, pissebedden en kleine kevers in diverse ontwikkelingsstadia. Soms voedt de kleine bonte specht zich met plantaardig voedsel, met name met bessen. Ook bezoekt hij voedertafels.

De kleine bonte specht foerageert in vrijwel alle vegetatielagen, maar voornamelijk in de bovenste boomlagen. Dankzij zijn lage gewicht kan hij aan dunne of dode takken te hangen terwijl hij naar voedsel zoekt. Wanneer de kleine bonte specht op zoek is naar houtbewonende keverlarven, slaat hij met zijn snavel stukken uit rot hout. Houtsnippers onderaan een boom is vaak een eerste indicatie dat er keverlarven in de bovenste takken leven.

Buiten het broedseizoen voedt de kleine bonte specht zich voornamelijk met insectenlarven, die hij vooral op dunne dode takken van levende bomen zoekt. Tijdens het broedseizoen jaagt hij ook op kleine ongewervelden die op de oppervlakte van bast en bladeren leven, zoals bladluizen. Dit vormt ook het hoofdvoedsel voor de nestlingen.

De nestholte wordt in een boomstam of sterke tak uitgehakt, meestal in zacht, dood hout. Ook worden oude nestholtes of natuurlijke boomholtes gebruikt. De kleine bonte specht maakt een vlieggat van 3 tot 3,5 cm op 10 tot 20 meter boven de grond. De nestholte is 10 tot 18 cm diep en de bodem is bedekt met houtkrullen en fijn zaagsel. Een schacht verbindt de holte met het vlieggat en kan relatief lang zijn. Vaak bevindt de eigenlijke holte zich 30 cm of meer onder de ingang.

Het broedsel bestaat uit 4 tot 7 eieren. Deze worden in 11 à 12 dagen door beide ouders uitgebroed. Na 18 tot 20 dagen vliegen de jongen uit. Er wordt per broedpaar jaarlijks slechts één legsel grootgebracht. Het komt vaak voor dat een vrouwtje met twee mannetjes paart en derhalve 2 legsels produceert.

In Nederland is de kleine bonte specht een vrij talrijke broedvogel in hoger gelegen gebieden met voldoende bossen. In de kustgebieden komt hij vrijwel niet voor, behalve in enkele oude bossen in de duinstreken. Doordat er meer bossen worden aangeplant, bestaande bossen verouderen en bosbeheerders vaker dood hout laten liggen, komt er steeds meer geschikt leefgebied voor de kleine bonte specht. (Bron: Wikipedia)